

*Dit geneesmiddel is in een ander land geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen. Deze productinformatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en is bedoeld als bron van algemene informatie over dit product voor dierenartsen en eigenaren.*

## Cunipravac® RHD Variant

### Farmaceutische vorm:

Emulsie voor injectie, flacon met 10 doses, flacon met 40 doses

### Samenstelling:

Geïnactiveerd Rabbit Hemorrhagic Disease Virus nieuwe variant (RHDV2),  
stam V-1037.

Bevat als hulpstoffen per 0,5 ml:

Minerale olie (adjuvans)	104,125 mg
Thiomersal (conserveringsmiddel)	0,05 mg

### Eigenschappen:

Actieve immunisatie van konijnen vanaf de leeftijd van 30 dagen tegen de nieuwe variant van het viraal hemorrhagisch syndroom VHD (=rabbit haemorrhagic disease, RHDV2).

Aanvang immuniteit: 7 dagen na vaccinatie.

Hervaccinatie (na 1<sup>e</sup> herhaling na 6 weken) iedere 6 maanden.

### Doeldieren:

Konijn.

### Indicaties:

Preventie van klinische symptomen en sterfte ten gevolge van de nieuwe variant van het viraal hemorrhagisch syndroom (rabbit haemorrhagic disease, RHDV2).

### Waarschuwingen en contra-indicaties:

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel, het adjuvans of één van de hulpstoffen.

De veiligheid van het vaccin is niet onderzocht bij zwangere of lacterende konijnen.

Dit product bevat minerale olie. Accidentele injectie / zelfinjectie kan ernstige lokale reacties veroorzaken, zeker in geval van injectie in een gewricht of vinger. Raadpleeg in dit geval onmiddellijk een arts. Consulteer opnieuw een arts indien de pijn meer dan 12 uur na het eerste medische onderzoek aanhoudt.

Informatie voor de arts: heftige zwelling tgv injectie van kleine hoeveelheid minerale olie kan leiden tot ischemische necrose en zelfs tot het verlies van een vinger. Het kan nodig zijn in een vroeg stadium een incisie te maken in het geïnjecteerde gebied en dit te irrigeren, met name wanneer de weke massa van de vinger of de pezen aangetast zijn.

**Toediening / Dosering:**

Dien 1 dosis van 0,5ml per dier toe via subcutane injectie in het nek- of schoudergebied bij konijnen vanaf de leeftijd van 30 dagen.

Hervaccineer 6 weken na de eerste vaccinatie en daarna elke 6 maanden

**Bijwerkingen:**

Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren): een tijdelijke verhoging van de lichaamstemperatuur met 1°C kan voorkomen 2-3 dagen na de vaccinatie. Deze verhoging verdwijnt zonder behandeling spontaan binnen 24 uur.

**Interacties met andere geneesmiddelen:**

Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin in combinatie met andere diergeneesmiddelen.

Er zijn geen studies gedaan naar het gelijktijdig gebruik van dit vaccin met de jaarlijkse Nobivac Myxo+RHD, maar er worden geen problemen verwacht van het gelijktijdig toedienen van beide vaccins, mits in aparte spuiten en op verschillende locaties ingespoten.

**Wachttijd:**

0 dagen

**Fabrikant:**

Hipra, Spanje

**Bewaarcondities:**

Het vaccin in de ongeopende verpakking houdbaar tot aan de op de verpakking vermelde datum mits in de koelkast bewaard (2-8 °C). Niet invriezen.

Na aanprikken is het product niet houdbaar.

Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren. Breng restanten van geneesmiddelen die niet meer worden gebruikt, ter vernietiging terug naar uw dierenarts of apotheek.

---

*Disclaimer: De Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product.*

*Ondanks de grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie, kunnen de auteurs geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zetfouten en andere onjuistheden.*

*Copyright: Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.*